



TEMMUZ AYI TARIM TAKVİMİ

Doğumun sürdüğü bu dönemde de sıcaklık, havalandırma, sulama ve gübrelemeye dikkat edilmelidir. Doğum izlenmelidir. Nematod zararının arttığı ve doğumların büyük bir kısmının tamamlandığı bu dönemde nematod mücadelesi, havalandırma, sıcaklık, sulama ve gübrelemeye dikkat edilmelidir.

Sulama;

Sulama ve buna bağlı olarak damlama ile gübreleme haftada 3 sefere uygulanmalı, önerdiğimiz sulama saatine göre sulama yapılmalıdır.

Gübreleme;

Düzenli olarak azot ve fosfor destekli, potasyum ağırlıklı gübreleme sürdürülmelidir. Önerilen gübreler ile haftada 3 sefer gübreleme sürdürülmelidir. Bu dönem bitkinin gövdesinin en fazla potasyum depoladığı, azot ve fosfor ihtiyacının azaldığı ancak doğum sonrası fidanların büyüklüğüne bağlı olarak azaltıldığı dönemdir. Haftalık 3 uygulama üzerinden dekara 250 gr saf Azot, 30 gr saf Fosfor ve 1.250 gr saf potasyum verilebilir. Ayrıca 15 gün ara ile dekara 2 kg kadar % 15 oranında Kalsiyum ve 500 gr kadar Mağnezium Sülfat gübresi tek başlarına ayrı ayrı verilmelidir. Sulama ile birlikte yapılan gübreleme, sulama süresince sürdürülmelidir. Ayda 1 kez kullanacağımız dekara 1 kg. Hümik Asit kaynaklı gübreler de yararlı olacaktır.

Havalandırma;

Sıcaklığı düşük tutacak şekilde alın ve tepe havalandırması sürdürülmelidir. Ortam nemini sık sık yapılacak sislemelerle yükselterek tepe havalandırması yapılmalıdır. Ortam nemi % 70'in altına düşürülmemelidir.

Sıcaklık;

Yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, sıcaklığın gündüz 35 derecenin üzerine çıkmaması için önlemler alınmalıdır. Her gün gündüz saat 11 den itibaren aralıklı olarak sisleme çalıştırılmalı, son dakikalarda sislemeden azotlu ve potasyumlu yapraktan alınabilen gübreler verilmelidir. Sisleme ile sıcaklığın etkisinin azalması sağlanamazsa, seranın tepesi açılmalı, buna rağmen sera içi sıcaklık en fazla 35 dereceyi geçerse sera yanları ve üstü çamur, kireç v.b. malzemelerle gölgeleme yapılmalıdır.

Bakım;

Kırmızı örümcek yoğunluğuna dikkat edilmelidir. Kırmızı örümcek mücadelesi için kırmızı örümcek mücadelesindeki uyarılar dikkatle uygulanmalıdır. Kök bölgesinde yoğunlaşacak nematod zararlısı izlenmeli, yoğunluk saptanırsa sıvı nematod ilaçları ile mücadele edilmelidir. Hevenklerin kırılmaması için destekler kullanılmalıdır. Fidan ayarı için derinden ilk çıkan, önerilen güçlü fidanlar bırakılmalı, diğer fidanlar imha edilmelidir. Sararan yaprakların parçalanarak malçlama işlevi yapması sürdürülmelidir. Kırmızı örümcek mücadelesi için üst üste aynı ilacı kullanmadan ve yumurta öldürücüleri de kullanarak mücadele edilmelidir. Kesinlikle yeşil yaprak kesilmemelidir.

MUZ SERALARINA ÖZEL SİGORTA;

Üreticiyi tatmin edecek fiyatlarda, teminatın % 1'nin de altında küçük bir oranda primle, dolu, fırtına, hortum, yangın gibi risklere karşı sera sigortası yapılmaktadır. 365 gün rahat uyumak için.

BAŞAK SİGORTA Anamur Acentesi Mehmet AKÇA Cep: 0535 0536 5770238
İş:0324 8167719 Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Halide Edip Adivar Cad. Taşkın Ap. Altı Anamur-Mersin