

Doğumun tamamlandığı bu dönemde de sıcaklık, havalandırma, sulama ve gübrelemeye dikkat edilmelidir. Ayrıca meyvelerin en çok istediği potasyum ağırlıklı gübrelemeye özel önem verilmelidir.

Sulama;

Sulama ve buna bağlı olarak damlama ile gübreleme haftada 3 sefer uygulanmalı, önerdiğimiz sulama saatine göre sulama yapılmalıdır.

Gübreleme;

Düzenli olarak azot ve fosfor destekli, potasyum ağırlıklı gübreleme sürdürülmelidir. Önerilen gübreler ile haftada 3 sefer gübreleme sürdürülmelidir. Doğumun tamamlanmasından 25 gün sonra fidanlarımız yeterli büyüklüğe geldiyse azotlu gübre uygulamasını bitirmemiz veya çok azaltmamız yerinde olur. Bu dönem doğumun tamamlandığı dönem olduğu için özellikle potasyum ağırlıklı gübreler uygulanmalıdır. Haftada 3 sefer yapılabilecek bir uygulamada dekara 150 gr saf Azot, 30 gr. Saf Fosfor ve 1300 gr. saf Potasyum verilmesi gereklidir. Bunların dışında ayrıca 15 gün ara ile dekara 2 kg kadar % 15 oranında Kalsiyum ve 500 gr kadar Mağnezyum Sülfat gübresi tek başlarına ayrı ayrı verilmelidir. Sulama ile birlikte yapılan gübreleme, sulama süresince sürdürülmelidir. Ayda 1 kez kullanacağımız dekara 1 kg. Hümik Asit kaynaklı gübreler de yararlı olacaktır.

Havalandırma;

Sıcaklığı düşük tutacak şekilde alın ve tepe havalandırması sürdürülmelidir.

Sıcaklık;

Yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, sıcaklığın gündüz 35 derecenin üzerine çıkmaması için önlemler alınmalıdır. Her gün gündüz saat 11 den itibaren aralıklı olarak sisleme çalıştırılmalı, son dakikalarda sislemeye azotlu ve potasyumlu yapraktan alınabilen gübreler verilmelidir. Sıcaklığı düşürmek ve nem oranını dengelemek için yapılan sislemeler veya yağmurlamalara dikkat edilmelidir. Aşırı nem oranları, meyve parmaklarında, havasız bırakılacak köklerde ve bitkinin değişik kısımlarında hastalıklara neden olabilir. Meydana gelebilecek bu tür hastalıkları kontrol etmek için ortam nemini düşürmeli, sisleme daha az çalıştırılmalı, damlamadan sistemik sıvı bakır gibi fungusitler ile meyve parmaklarına bakırlı veya uygun mantar ilaçları kullanılmalıdır.

Bakım :

Kırmızı örümcek yoğunluğuna dikkat edilmelidir. Kırmızı örümcek mücadelesi için kırmızı örümcek mücadelesindeki uyarılar dikkatle uygulanmalıdır. Kök bölgesinde yoğunlaşacak nematod zararlısı izlenmeli, yoğunluk saptanırsa sıvı nematod ilaçları ile mücadele edilmelidir. Hevenklerin kırılmaması için destekler kullanılmalıdır. Ayrıca anası 30 gün kadar önce doğurmuş, kendisi aşırı büyümüş ancak ekimde doğuramayacak kadar olan ve anaya beslenme yönünden ortak olan fidanlar daldız kullanarak alınabilir.

MUZ SERALARINA ÖZEL SİGORTA;

Üreticiyi tatmin edecek fiyatlarda, teminatın % 1'nin de altında küçük bir oranda primle, dolu, fırtına, hortum, yangın gibi risklere karşı sera sigortası yapılmaktadır. 365 gün rahat uyumak için.

BAŞAK SİGORTA Anamur Acentesi Mehmet AKÇA Cep: 0535 0536 5770238
İş:0324 8167719 Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Halide Edip Adivar Cad. Taşkın Ap. Altı Anamur-Mersin